

# LÄKEMEDELSBERÄTTELSE I TAKECARE

## Manual användare

## Innehåll

<b>1. Läkemedelsberättelse - Projektgrupp .....</b>	<b>3</b>
1.1 Bakgrund .....	3
1.2 Resultat .....	3
<b>2. Instruktion för användare .....</b>	<b>4</b>
2.1 Journalmall .....	4
2.2 Tilläggsmallar med fördefinierat innehåll .....	5
2.2.1 Lägg till tilläggsmall i journalmall.....	5
2.3 Exempel journaltext vid användande av tilläggsmallar .....	8

## 1. Läkemedelsberättelse - Projektgrupp

### 1.1 Bakgrund

Under 2014 genomfördes ett projekt i SLL/Region Gotland med syftet att förbättra dokumentationen av läkemedelsberättelse då det har saknats enhetlighet kring detta. Projektgruppen bestod av läkare, sjuksköterskor, farmaceut och informatiker. Idag saknas ett tillfredsställande stöd i läkemedelsjournalen vid formandet av läkemedelsberättelse. Projektgruppen har därför formulerat och kartlagt behovs- och utvecklingsönskemål i läkemedelsjournalen och lämnat dessa vidare till leverantören.

### 1.2 Resultat

Regler för läkemedelsberättelse är framtagna i ett samarbete mellan Objektet Läkemedelsprocess och Metod och Kompetensstöd Informatik.

Nya termer för läkemedel är framtagna så att innehållet i läkemedelsberättelsen blir mer patientvänligt, t.ex. Nya/Borttagna läkemedel istället för Insatta/Utsatta läkemedel.

För att underlätta för både patient och journalförande läkare har projektgruppen valt att inte skapa en egen mall för läkemedelsberättelse utan låta den ingå i utskrivningsmeddelandet. "Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse" är placerad på systemgemensam nivå då målet har varit att utforma en mall som alla verksamheter kan använda. På så sätt får man ett så enhetligt sätt kring dokumentation av läkemedelsberättelse som möjligt.

Informationen i utskrivningsmeddelandet är till stor del vårdspecifikt. Därför finns det på vårdenhetsnivå möjlighet att skapa tilläggsmallar med fördefinierat innehåll som kan lyftas in i den systemgemensamma journalmallen. I manualen "Läkemedelsberättelse – Manual lokal systemadministratör" finns instruktioner om tillvägagångssätt.

## 2. Instruktion för användare

### 2.1 Journalmall

För att ge patienten bra information samt för att underlätta för journalföraren, finns en gemensam journalmall för utskrivningsmeddelande och läkemedelsberättelse. Journalmallen ligger på systemgemensam nivå och heter *"Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse"*.

#### UTSKRIVNINGSMEDDELANDE

<b>Vårdtid</b>	Här anges datumperiod för vårdtid.
<b>Ansvarig läkare</b>	Ansvarig läkare får inte dokumenteras i fritext utan måste anges i rutan med rubriken "Användare". Detta för att namnet ska vara möjligt att härleda.
<b>Utskrivande läkare</b>	Utskrivande läkare får inte dokumenteras i fritext utan måste anges i rutan med rubriken "Användare". Detta för att namnet ska vara möjligt att härleda.
<b>Omvårdnadsansvarig ssk</b>	Omvårdnadsansvarig ssk får inte dokumenteras i fritext utan måste anges i rutan med rubriken "Användare". Detta för att namnet ska vara möjligt att härleda.
<b>Sammanfattning vårdperiod</b>	Här ska uppgifter om orsak till inläggning samt vårdavdelning finnas. Det är viktigt att ange om patienten varit utplacerad på annan avdelning än för aktuell vårdspecialitet. Under detta sökord är det möjligt att lägga en tilläggsmall med vårdspecifikt fördefinierat innehåll. Då kommer tilläggsmallens sökord "Vårdförlopp" istället synas när journalanteckningen sparas och skrivs ut. Om man väljer att själv dokumentera under detta sökord utan att använda sig av tilläggsmallen, är det "Sammanfattning vårdperiod" som blir det synliga sökordet i journalanteckningen.

#### Läkemedelsberättelse


Nya läkemedel	Här kan man välja om man hellre vill dokumentera i kommentarsfältet än i angivna rutor, men då måste rutornas rubriker finnas med i texten.
Borttagna läkemedel	Här kan man välja om man hellre vill dokumentera i kommentarsfältet än i angivna rutor, men då måste rutornas rubriker finnas med i texten.
Ändring av läkemedelsdos	Här kan man välja om man hellre vill dokumentera i kommentarsfältet än i angivna rutor, men då måste rutornas rubriker finnas med i texten. Under de tre första sökorden i Läkemedelsberättelsen finns förvalt alternativ då det inte har skett några förändringar av patientens läkemedel.
Recept skickat till apotek	Här finns förvalt alternativ samt möjlighet till text i kommentarsfält.
Dosförpackade läkemedel ändrade	Här finns förvalt alternativ samt möjlighet till text i kommentarsfält.
Övriga åtgärder som rör läkemedel	Här finns förvalt alternativ för dokumentation av datumperiod då läkemedel är delade i dosett samt möjlighet till text i kommentarsfält.
<b>Uppföljning</b>	Här ska uppgifter om rekommendationer, restriktioner, återbesök, läkemedelsuppföljning samt kontaktuppgifter finnas. Under detta sökord är det möjligt att lägga en tilläggsmall med vårdspecifikt fördefinierat innehåll. Då kommer tilläggsmallens sökord "Rekommendationer" istället synas när journalanteckningen sparas och skrivs ut. Om man väljer att själv dokumentera under detta sökord utan att använda sig av tilläggsmallen, är det "Uppföljning" som blir det synliga sökordet i journalanteckningen.
<b>Kopia till</b>	Här finns förvalt alternativ samt möjlighet till text i kommentarsfält.

## 2.2 Tilläggsmallar med fördefinierat innehåll


Informationen i ett utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse är till stor del vårdspecifik. Av den anledningen har de lokala systemadministratörerna på varje vårdenhets möjlighet att skapa egna tilläggsmallar med särskilt fördefinierat innehåll. För att få ett läsvänligt flöde i utskrivningsmeddelandet ska innehållet i tilläggsmallarna delas upp i två tilläggsmallar. På så sätt särskiljer man på information om vad som hänt under vårdtiden från rekommendationer som har med eftervården att göra.

### 2.2.1 Lägg till tilläggsmall i journalmall

Öppna den systemgemensamma journalmallen *Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse* och markera sökordet *Sammanfattning vårdperiod*. Klicka på *Lägg till mall*.




Välj *Sammanfattning vårdperiod* + *aktuell diagnos* (i detta exempel *Sammanfattning vårdperiod Varicerop*) Klicka på *OK*.




## LÄKEMEDELSBERÄTTELSE I TAKECARE

## Manual användare


Sökordet (tilläggsmallen) *Vårdförlopp* hamnar under Sammanfattning vårdperiod i vänsterkolumnen. Klicka en gång på *Lägg till innehåll...*



En ruta med sökordet *Vårdförlopp* kommer då upp, klicka på denna en gång. Det fördefinierade innehållet läggs till i journalmallen. Texten kan redigeras efter behov.



Genomför samma procedur under sökordet *Uppföljning*. Välj tilläggsmallen *Uppföljning* och lägg till det fördefinierade innehållet *Rekommendationer*.



## LÄKEMEDELSBERÄTTELSE I TAKECARE

### Manual användare

19 500505-0520 Testperson Testa - Ny Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse - Läkare

2015-06-02 16:11 Sign.ansv: 19PX Ulrica Lanbro Kennegård (sys. Kontrasign.ansv:

UTSKRIVNINGSMEDDELANDE

- Vårdtid
- Ansvarig läkare
- Utskrivande läkare
- Omvårdnadsansvarig ssk
- Sammanfattning vårdperiod
- Vårdförlopp**
- Läkemedelsberättelse
- Nya läkemedel
- Borttagna läkemedel
- Ändring av läkemedelsdos
- Recept skickat till apotek
- Dosförpackade läkemedel ändrade
- Övriga åtgärder som rör läkemedel
- Uppföljning
- Rekommendationer**
- Kopia till

**Rekommendationer**

På grund av operationen kommer Du bli öm samt få en svullnad och missfärgning runt hudsnitten på benet. Ömheten och svullnaden är värst de första dagarna. Om det inte blir bättre utan blir mer svullet eller om Du får mer ont ska du kontakta sjukvården.

Båndaget på benet motverkar blödningar och minskar på så sätt svullnaden efter operationen. Båndaget består av en självhäftande helbenslinda som ska sitta på första dygnet efter operationen. Därefter kan Du lossa på den övre delen av båndaget som sitter över låret och behålla den nedre delen av lindan ytterligare en vecka. Om båndaget sitter för hårt eller på annat sätt ej fungerar bra kan Du vända Dig till distriktsköterskan på Din vårdcentral som kan hjälpa Dig med att justera båndaget. Efter en vecka kan Du återgå till Din vanliga stödstrumpa som går upp på knät och Du kan som vanligt ta av den på natten. Du bör fortsätta använda Dina stödstrumpor dagligen för att motverka att nya åderbräck uppkommer.

Ditt sår under ytan är sytt med stygn som löser upp sig själva. Du kan själv ta bort förbandet efter ca en vecka. Om såret blir ömmande, irriterat, svullet, rodnat, vätskar sig eller om Du får feber ska Du ta kontakt med sjukvården.

Anledningen till att det fördefinierade innehållet i de två tilläggsmallarna har sökorden *Vårdförlopp* och *Rekommendationer* istället för *Sammanfattning vårdperiod* och *Uppföljning* som i den systemgemensamma journalmallen, beror på att det inte går att lägga till en tilläggsmall om den innehåller samma sökord som huvudmallen.

## 2.3 Exempel journaltext vid användande av tilläggsformular

### UTSKRIVNINGSMEDDELANDE

**Vårdtid** Fr.o.m: 2015-05-13 06:10  
T.o.m.: 2015-06-02 13:26

**Utskrivande läkare** Ulrica Lanbro Kennegård (sys.förv) /19px/

**Värdförlopp** Vi hoppas att denna information ska underlätta för Dig när Du kommer hem. Läs gärna igenom innan Du lämnar sjukhuset så du har möjlighet att fråga om det är något Du inte förstår.

Du har opererats för åderbräck. Vid operationen har flera saker åtgärdats I ljumsken har det ytliga större blodkärlet som inte fungerade normalt knutits av. Därefter har vi tagit bort det genom att dra ut det längre ned på benet. Det innebär att det är ett större sår under huden än vad som syns på ytan. Du har också fått ytliga blodkärl borttagna via mindre hudsnitt.

### Läkemedelsberättelse

**Nya läkemedel** Du har fått: Alvedon  
Orsaken är: Smärta  
Målet med behandlingen är: Att du ska bli smärtfri

**Borttagna läkemedel** Du har inte fått några läkemedel borttagna

**Ändring av läkemedelsdos** Förändring: Minskat  
Dosen av: Furix  
Orsaken är: Lågt blodtryck

**Recept skickat till apotek** Ja

**Dosförpackade läkemedel ändrade** Nej

**Övriga åtgärder som rör läkemedel** Läkemedel delade i dosett  
för perioden 20150602-20150609

### Rekommendationer

På grund av operationen kommer Du bli öm samt få en svullnad och missfärgning runt hudsnitten på benet. Ömheten och svullnaden är värst de första dagarna. Om det inte blir bättre utan blir mer svullet eller om Du får mer ont ska du kontakta sjukvården.

Bandaget på benet motverkar blödningar och minskar på så sätt svullnaden efter operationen. Bandaget består av en självhäftande helbenslinda som ska sitta på första dygnet efter operationen. Därefter kan Du lossa på den övre delen av bandaget som sitter över låret och behålla den nedre delen av lindan ytterligare en vecka.

Om bandaget sitter för hårt eller på annat sätt ej fungerar bra kan Du vända Dig till distriktsköterskan på Din vårdcentral som kan hjälpa Dig med att justera bandaget. Efter en vecka kan Du återgå till Din vanliga stödstrumpa som går upp på knät och Du kan som vanligt ta av den på natten. Du bör fortsätta använda Dina stödstrumpor dagligen för att motverka att nya åderbräck uppkommer.

Ditt sår under ytan är sytt med stygn som löser upp sig själva. Du kan själv ta bort förbandet efter ca en vecka. Om såret blir ömmande, irriterat, svullet, rodnat, vätskar sig eller om Du får feber ska Du ta kontakt med sjukvården.

Det är viktigt att Du är ute och promenerar och rör på Dig efter operationen. Det är också bra att ha benet högt om Du vilar eller sitter stilla. Du kan redan dagen efter operationen börja promenera och inom några dagar återgå till Dina normala aktiviteter. Under de två första veckorna bör Du dock undvika tunga lyft.

Kirurgmottagningen nås på telefonnummer 268499 måndag-torsdag kl 08:15-13:30. Övrig tid vänligen ring sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

**Kopia till** Patient