

## Observandum Lactated Ringer's!

**Det finns risk för utfällning då Ringer-Laktat (Lactated Ringer's) blandas med vissa läkemedel.** Ringer-Laktat ska därför inte ges samtidigt i samma infusions slang, y-koppling eller venkateter som följande läkemedel:

**Propofol\***  
**Nitroglycerin**  
**Lorazepam**  
**Metylprednisolon**  
**Ketamin**  
**Furosemid\*\***  
**Fenytoin**  
**Esketamin**  
**Diazepam**  
**Cyklosporin**  
**Ciprofloxacin**  
**Ceftriaxon**  
**Amiodaron**  
**Amfotericin B**

\* För propofol finns både kompatibla och inkompatibla studieresultat.

\*\*Det finns en relativ inkompatibilitet med furosemid. Ringer-Laktat ska inte ges tillsammans med furosemid-koncentrationer över 5 mg/ml.

Var god se länkar för mer information:

[Compatibility of Lactated Ringer's Injection With 94 Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-site Administration - PubMed](#)

Vallée et al., Hosp Pharm 2021; 56(4):228-234

[Läkemedelskatalog - Blandbarhet](#)

(Västra Götalandsregionens Blandbarhetsdatabas, Ringer-Laktat)

**Region Stockholms expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård**