

Utlåtande från expertrådet för vaccinationer

Barnvaccinationer

Tabell 4. Kombinationer av vacciner

Given vaccination mot	Tuberkulos* (BCG)	DTP-polio Hib	DTP-polio Hib+Hep B	Pneumo-kocker	MPR	Vatt-koppor	Gula febern
Tuberkulos* (BCG)	X	Ja	Ja	Ja	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Samma dag eller vänta minst fyra veckor
MPR	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Ja	Ja	Ja	X	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Vatt-koppor/bältros	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Ja	Ja	Ja	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	X	Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Gula febern	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Ja	Ja	Ja	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	Samma dag eller vänta minst fyra veckor	X
DTP-Polio-Hib	Ja	X	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DTP-polio-Hib +Hepatit B	Ja	Ja	X	Ja	Ja	Ja	Ja
Pneumo-kocker	Ja	Ja	Ja	X	Ja	Ja	Ja
Hepatit A	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Given vaccination mot	Tuberkulos* (BCG)	DTP-polio Hib	DTP-polio Hib+Hep B	Pneumokocker	MPR	Vattkoppor	Gula febern
Hepatit B	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TBE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HPV	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Influensa	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotavirus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meningokock-sjukdom	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tyfoidfeber intramuskulärt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tyfoidfeber per oralt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Japansk encefalit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rabies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kolera per oralt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Eftersom MPR-vaccinationen kan försvaga tuberkulinreaktionen bör man vänta fyra veckor efter MPR-vaccinationen med att sätta/ testa med PPD/IGRA. Om PPD eller IGRA test sätts/tas först så kan MPR ges därefter utan särskilt intervall.