

NLT-gruppen

Landstingsdirektörsnätverket

NLT-gruppens rekommendation till landstingen gällande strokeförebyggande behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer

NLT-gruppens tidigare rekommendation till landstingen angående nya perorala antikoagulantia som alternativ till warfarin vid förebyggande behandling mot stroke vid förmaksflimmer var i behov av uppdatering. Numera finns flera nya antikoagulantia med denna indikation varför NLT-gruppens rekommendation nu ändras att gälla alla aktuella preparat. Flertalet patienter med förmaksflimmer bör erhålla någon form av effektiv förebyggande behandling mot stroke enligt gällande riktlinjer.

NLT-gruppens rekommendation är:

- att warfarin även fortsättningsvis är förstahandsbehandling till denna patientgrupp, liksom bl.a. för patienter med samtidig klaffsjukdom
- att behandling med perorala antikoagulantia endast påbörjas i samråd mellan patientansvarig läkare och medicinskt ansvarig för AK-mottagning/koagulationssjukdomar eller motsvarande lämplig specialist. Detta gäller såväl vid nyinsättning som vid övergång från warfarinbehandling
- att landstingen även fortsättningsvis måste kunna erbjuda kompetent rådgivning till alla antikoagulantiabehandlade patienter. Detta omfattar bl.a. råd vid val av behandling, akuta blödningsbiverkningar och inför operativa ingrepp
- att uppföljning av alla patienter som behandlas med antikoagulantia **ska** ske genom registrering i ett nationellt kvalitetsregister eller motsvarande. Det är särskilt viktigt att ställningstagandet till och motivet för val av preparat dokumenteras i registret.

För NLT-gruppen

Anders Hallberg
Ordf NLT-gruppen