

Behandlingsanvisningar till Akutask Hjärt-lungräddning APL

Åtgärder vid Hjärt-lungräddning – Hjärtstopp (vuxna)

Följ Svenska HLR-rådets instruktion, [åtgärds- och behandlingsanvisningar AHLR – VUXEN 2016](#). Vid hjärtstopp innebär detta bland annat:

Inj Adrenalin 0,1 mg/ml, 10 ml intravenöst.

Vid VF/VT ges den första dosen efter den tredje defibrilleringen.

Vid asystoli och pulslös elektrisk aktivitet (PEA) ges första dosen så snart som möjligt och därefter var fjärde minut vid HLR med pågående hjärtkompressioner.

Inj Cordarone 300 mg (6 ml Cordarone, 50 mg/ml, blandas med 14 ml Glukos 50 mg/ml till sammanlagd volym 20 ml) ges långsamt intravenöst om fortsatt kammarflimmer eller kammartakykardi efter tredje defibrilleringen och ytterligare 150 mg intravenöst om VT/VF kvarstår efter 5:e defibrilleringen (3 ml Cordarone, 50 mg/ml, blandas med 7 ml Glukos 50 mg/ml till sammanlagd volym 10 ml).

Inf Tribonat 100 ml kan övervägas vid hjärtstopp på grund av hyperkalemi samt vid intoxication med tricykliska antidepressiva.