

Patientinformation – vid vätskebrist behöver vissa läkemedel pausas

Region Stockholms läkemedelskommittés
expertgrupp för äldres hälsa

Region Stockholm

Region Stockholms läkemedelskommittés
expertgrupp för äldres hälsa


Region Stockholm

Patientinformation – vid vätskebrist behöver vissa läkemedel pausas

Det finns olika orsaker till att pausa läkemedel vid vätskebrist. Läkemedel kan ansamlas i kroppen och orsaka biverkningar. Andra läkemedel kan öka vätskebristen ytterligare och vissa läkemedel försämrar njurarnas funktion.

Exempel på när läkemedel kan behöva pausas vid vätskebrist:

- Vid ökade vätskeförluster, t.ex. vid kräkningar och diarréer, feber >38 °C, värmebölja.
- Vid akut sjukdom med svårigheter att äta och dricka.
- Vid bristande mat- och vätskeintag av andra orsaker.



Här kan **du tillsammans med din läkare** skriva vilka läkemedel du inte ska ta om du drabbas av vätskebrist:

Läkemedelsbehandlingen återupptas cirka ett dygn efter att du börjat äta och dricka normalt, om inte sjukvården gett annan information.

Vid tveksamhet kontakta din behandlande läkare eller 1177 Vårdguiden, telefon: 1177.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Region Stockholm