



NLT- gruppen

Hälso- och Sjukvårdsdirektörs-  
Nätverket

## NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande trastuzumab-emtansin (Kadcyla<sup>®</sup>)

### NLT-gruppen rekommenderar landstingen att:

- använda Kadcyla vid den utvärderade indikationen (se nedan) enligt det avtalade pris som företaget erbjudit.

### Bakgrund

Trastuzumab-emtansin (Kadcyla<sup>®</sup>) är ett antikropp-läkemedelskonjugat mellan trastuzumab och den cytotoxiska substansen DM<sub>1</sub>. Den utvärderade indikationen för trastuzumab-emtansin är monoterapi vid behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination.

### Hälsoekonomisk värdering

På uppdrag av NLT-gruppen har TLV i sitt [klinikläkemedelsprojekt](#)<sup>1</sup> tagit fram ett hälsoekonomiskt [kunskapsunderlag](#)<sup>2</sup> med bedömning av kostnadseffektiviteten för behandling med Kadcyla<sup>®</sup>. TLV har bedömt att två relevanta jämförelsealternativ finns: lapatinib (Tyverb<sup>®</sup>) + capecitabin (Xeloda<sup>®</sup>) (LapCap) samt trastuzumab (Herceptin<sup>®</sup>) + capecitabin (Xeloda<sup>®</sup>) (TrastCap). Lapatinib används i mycket begränsad utsträckning i Sverige och NLT har därför värderat kostnadseffektiviteten för Kadcyla primärt i relation till TrastCap-alternativet. Efter att den hälsoekonomiska värderingen publicerats inkom företaget med kompletterande uppgifter. På begäran av NLT-gruppen uppdaterades därför den hälsoekonomiska värderingen.

### Säkerheten i resultaten

TLV bedömer att osäkerheten i resultaten för Kadcyla<sup>®</sup> vs LapCap som låg, eftersom denna är uppbyggd på en direkt jämförande studie.

Osäkerheten i jämförelsen mellan Kadcyla<sup>®</sup> och TrastCap är högre på grund av den indirekta jämförelsen.

### Sveriges Kommuner och Landsting

118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20  
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50  
E-post: info@skl.se, www.skl.se

**NLT-gruppen gör följande bedömning:**

HER2-positiv, icke-resektabel eller lokalt avancerad bröstcancer är en sjukdom av mycket hög svårighetsgrad och det finns ett stort behov av behandling. Storleken på effekten av Kadcyla är kliniskt relevant, men kostnaden för behandling med Kadcyla<sup>®</sup> är hög, c:a 950.000 kr per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med TrastCap. I denna kostnad är skillnader i indirekta kostnader (c:a 100.000 kr per kvalitetsjusterat levnadsår) inkluderade (exempelvis kostnader för konsumtion som den ökade överlevnaden medför),

NLT-gruppen har haft diskussioner med läkemedelsföretaget och har för landstingens räkning fått ett erbjudande om ett lägre pris vilket medför att kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår sjunker. Rabattnivån är inte offentlig men hanteras i form av en rak nettoprissänkning enligt ett särskilt avtal och bedöms således inte medföra någon påtagligt ökad administrativ börda för landstingen.

Efter en sammanvägd bedömning och med en etisk värdering av betydelsen av de indirekta kostnaderna, rekommenderar NLT-gruppen landstingen att använda Kadcyla<sup>®</sup> vid den utvärderade indikationen till det avtalade pris som företaget erbjuder.

För NLT-gruppen

Anders Hallberg, ordförande NLT- gruppen

**Referenser:**

1. [www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsprojektet/omkliniklakemedelsprojektet/](http://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsprojektet/omkliniklakemedelsprojektet/)
2. <http://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsprojektet/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/halsoekonomisk-bedomning-av-kadcyla/>

Kontaktuppgift företag: Roche AB, [www.roche.se](http://www.roche.se)