

Den 2:a juni så aktiveras Äldreknappen för alla, i Janusfönster

Äldreknappen är en tjänst i Janusfönster som HSF tog fram förra året. Den har varit i drift på ett flertal vårdcentraler och geriatriska kliniker i SLL och efterfrågas av fler och fler vårdenheter och vårdgivare.

Äldreknappen blir aktiv om patienten är 75 år eller äldre

Äldreknappen visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre om inte särskilda skäl föreligger, enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi för äldre. (Lista 1.1) De preparat som finns upptagna i lista 1.1 är läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre såsom, Långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin.


Informationskällan till Äldreknappen

Informationen hämtar Janusfönstret från SIL (svensk informationsdatabas för läkemedel. (Det är samma informationskälla som Pascal kommer att använda för att markera om ett läkemedel bör undvikas för äldre, nyhet i Pascal i juni)

Hur fungerar tjänsten Äldreknappen

Journalssystem med Janusfönster integrerat, skickar patientens ålder, kön och läkemedelslista till Janusfönstret. Janusfönster söker i SIL och skickar tillbaka information till äldreknappen i form av färgsignal.

Äldreknappen´s färgsignaler (exempelbild på Janusfönster för patient 75 år eller äldre)



Röd knapp: Patient 75 år eller äldre och har läkemedel som bör undvikas, enligt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. lista 1.1



Blå knapp: Patient 75 år eller äldre och har inga läkemedel som bör undvikas, enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. lista 1.1




Grå knapp: Patient är under 75 år.
Knappen är klickbar, även när den är grå

INFORMATION SOM BERÖR
JANUSFÖNSTER
Utskick 2014-05-23

Vid klick på Äldreknappen visas preparatspecifik information





Patientens läkemedelslista, markering av de läkemedel som bör undvikas, konsekvens och rekommendation samt länk till SoS rapport



Läkemedel och äldre - Windows Internet Explorer
http://10.64.9.76/ddb/toolbar/Modules/antiList/antilist.jsp

Läkemedel och äldre Skriv ut sidan

Markerade läkemedelsprodukter bör undvikas hos patienter 75 år och äldre, om inte särskilda skäl föreligger. Det ska finnas en välggrundad och aktuell indikation för att använda läkemedlet. Ordinatören ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervall.

Läkemedelsprodukt	Bör undvikas ≥ 75 år	Rekommendation
Alvedon Dos Tablett		Rekommendation saknas.
Propavan Tablett		Kan ge dagtrötthet hos äldre och framkalla extrapyramidala symtom, bland annat restless legs.
Tradolol Filmträgerad tablett		Ökad risk hos äldre för illamående och centralnervösa biverkningar såsom förvirring. Tramadol bör inte kombineras med andra läkemedel som påverkar signalsubstansen serotonin, såsom SSRI-preparat, på grund av ökad risk för serotoninergt syndrom.
Stesolid Tablett		Benzodiazepin med lång halveringstid. Förenade med risk för dagtrötthet (hangover), kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall. Preparaten bör undvikas vid nyinsättning. Om patienten redan använder ett sådant preparat bör man dock bedöma risken för abstinensbesvär vid utsättning.
Atarax Filmträgerad tablett		Kan framkalla kognitiva störningar, som kan yttra sig som alltifrån lättare minnesstörningar till förvirring (konfusion). Risken är särskilt stor hos äldre med demens av Alzheimerstyp, men tilltar även vid normalt åldrande.

• Observera att licens- och extemporeläkemedel (inklusive lagerberedningar och rikslicenser) inte kommer med i sökningen.
• * = Parallellimport med olika handelsnamn finns.

Källa:
Information bygger på Socialstyrelsens rapport: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Tjänsten är framtagen av Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Varför aktiveras Äldreknappen för alla?

Andel patienter över 75 år som står på läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger, är en kvalitetsindikator framtagen av socialstyrelsen som mäts regelbundet. Äldreknappen är en del av aktiviteterna i arbetet att minska andelen patienter inom Stockholms läns landsting utifrån denna indikator

Användarhandledning

Finns under knappen  i Janusfönster.

Se även information på vår hemsida (på Vårdgivarguiden)

<http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-system/Beslutsstod/Janusfonster/>

Utbildning

Det krävs ingen utbildning för att kunna använda sig av Äldreknappen. Bildspel (powerpoint) och broschyr för Äldreknappen kan beställas via e-tjanster@sll.se